

...święd powróci pod koniec okresu pomiędzy poszczególnymi aplikacjami?

Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem weterynarii. Często wystarczy jedynie skrócić przedział czasu pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.

...terapia odczulająca jest skuteczna?

Wówczas w żadnym wypadku nie należy przerywać terapii. Terapia powinna być kontynuowana przez parę lat, a niekiedy nawet dożywotnio. Można jednak zmniejszyć częstotliwość aplikacji, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, ponownie ją zwiększyć. W przypadku przerwania skutecznej terapii nastąpi stopniowy nawrót objawów, gdyż alergię jest schorzeniem nieuleczalnym. Przerwaną terapię rozpoczyna się zupełnie od nowa, co dotyczy również testów alergicznych, gdyż w międzyczasie – szczególnie po dłuższej przerwie – mogło dojść do zmiany spektrum alergenów. Ponadto dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż po przerwaniu terapii szanse na powodzenie ponownej terapii są z reguły mniejsze.



Uwaga!

Plan terapii stanowi wprawdzie istotny punkt odniesienia, lecz każde zwierzę reaguje na terapię w inny sposób. Z tego względu u poszczególnych zwierząt może zachodzić konieczność indywidualnego dostosowania terapii. Zaleca się dokładną obserwację zwierzęcia, gdyż wszelkie informacje udzielone przez właściciela mogą w sposób istotny pomóc lekarzowi weterynarii w indywidualnej adaptacji planu terapii.

Alergia jest schorzeniem nieuleczalnym, lecz w większości przypadków swoista immunoterapia alergenowa pozwala ją z powodzeniem kontrolować!

Również w przypadkach, gdy terapia jest skuteczna, co jakiś czas mogą występować fazy, w których zachodzi konieczność stosowania dodatkowych leków, jednak dzięki swoistej terapii alergenowej fazy te są znacznie krótsze i rzadsze.

Terminarz wizyt

Wydął: _____

Pieczęć lecznicy: _____

Imię zwierzęcia: _____

Imię i nazwisko właściciela: _____

Terminy wizyt:

Data	Godzina

Niniejszą ulotkę, a także wiele innych użytecznych informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.laboklin.pl w zakładce WETINFO, również w wersji do pobrania.

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

www.laboklin.pl

LABOKLIN Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa

OBSŁUGA LABORATORIUM:
tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, infolinia: 800 100 101
fax: +48 22 691 92 92, e-mail: lab.warszawa@laboklin.com

22 691 93 10
lab.warszawa@laboklin.com

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

**Swoista
immunoterapia
alergenowa**
(odczulanie)



www.laboklin.pl

W przypadku jakich schorzeń zalecane jest stosowanie swoistej immunoterapii alergenowej?

W przypadku atopowego zapalenia skóry. Jest ono objawem uczulenia na trawę, pyłki drzew i bylin, roztocza kurzu domowego, roztocza spizarniane, pleśnie, ukąszenia owadów, sierść i złuszczone naskórek. Organizm zwierząt wykazujących dziedziczną skłonność do AZS reaguje na ww. alergeny wytwarzając przeciwciała z grupy IgE. Rezultatem są różnego rodzaju reakcje alergiczne, takie jak świąd, któremu towarzyszyć mogą również zmiany skórne oraz astma (dotyczy to w szczególności kotów i koni).

Jeżeli lekarz weterynarii na podstawie próby skórnej bądź badania krwi zdiagnozuje u naszego zwierzęcia alergię, wówczas wiadomo dokładnie, na jakie substancje uczulone jest zwierzę. Następnym krokiem powinno być podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia w formie swoistej immunoterapii alergenowej.

Na czym polega swoista immunoterapia alergenowa?

„Swoista immunoterapia alergenowa polega na stopniowym osłabianiu alergicznych reakcji organizmu zależnych od przeciwciał IgE poprzez regularną podskórną aplikację wywołujących je alergenów przez dłuższy okres czasu w podprogowych i powoli rosnących stężeniach.”

Co to dokładnie oznacza? Z substancji, na które zwierzę zareagowało pozytywnie podczas testu alergicznego (warunkiem jest znaczna korelacja z historią choroby i objawami klinicznymi), sporządza się indywidualny alergenowy roztwór odczulający (z tego względu okres oczekiwania może wynosić od 3 do 4 tygodni). Poprzez podskórną aplikację alergenów w stopniowo rosnącym stężeniu próbuje się uzyskać wzrost tolerancji organizmu na działanie tychże alergenów. Terapia jest skuteczna w 70-80% przypadków.



Stosowanie terapii

Swoistą immunoterapię alergenową stosuje się z reguły w przypadkach, gdy dolegliwości związane z alergią utrzymują się u zwierzęcia dłużej niż 3-4 miesiące w roku.

Do rozpoczęcia terapii konieczny jest roztwór odczulający w dwóch różnych stężeniach. Terapia odbywa się według poniższych zasad:

- Na początku terapii alergeny aplikowane są raz w tygodniu, później przedział czasu pomiędzy poszczególnymi aplikacjami można zwiększyć do 2-4 tygodni.
- Należy bardzo rygorystycznie przestrzegać przedziałów czasu pomiędzy aplikacjami. W razie przekroczenia terminu kolejnej aplikacji terapię można kontynuować tylko wówczas, jeżeli od jej terminu upłynął maksymalnie tydzień czasu.
- Dokonując pierwszej aplikacji z nowego opakowania roztworu należy obserwować zwierzę przez 30-60 minut w związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji. Występują one jednak bardzo rzadko.
- Przez godzinę przed i po aplikacji zwierzę nie powinno przyjmować pożywienia.
- W ciągu pierwszych kilku godzin po zaaplikowaniu roztworu alergenów zwierzę powinno unikać wysiłku fizycznego (długie spacerowanie, zabawy).
- W dniu aplikacji roztworu zwierzę nie powinno otrzymywać jakichkolwiek szczepionek.
- Buteleczki z roztworem należy przechowywać w lodówce.
- Należy odpowiednio wcześniej zamówić roztwór do terapii podtrzymującej, aby uniknąć nawrotu objawów.

Przebieg terapii

Na początku terapii zachodzi nierzadko konieczność równoległego stosowania innych leków, np. preparatów łagodzących świąd u zwierzęcia. Zaleca się jednak, aby równoległe stosowanie innych leków ograniczyć do niezbędnego minimum, gdyż natężenie objawów jest miernikiem skuteczności terapii, w związku z czym inne leki mogą ograniczać jej skuteczność.

Alergeny muszą być aplikowane w regularnych odstępach czasu w rosnących dawkach. Swoista terapia alergenowa jest skuteczna w 70-80% przypadków, lecz na początku terapii nie można stwierdzić, czy leczone zwierzę znajdzie się w grupie zwierząt reagujących na leczenie dobrze bądź bardzo dobrze, czy też należeć będzie do znacznie mniejszej liczebnie grupy zwierząt, u których terapia odnosi mierny skutek bądź nie działa w ogóle. Terapia wymaga dużej cierpliwości. U niektórych zwierząt poprawa następuje już po kilku tygodniach, a u innych z ostateczną oceną skuteczności terapii należy poczekać kilka miesięcy, a nawet rok.

Co robić, gdy...

...terapia nie przynosi poprawy lub gdy objawy po uzyskaniu początkowej poprawy ponownie uległy pogorszeniu?

Należy skontaktować się z lekarzem weterynarii, gdyż w grę może wchodzić zupełnie inny czynnik lub schorzenie. Może to być skutkiem aktywności pasożytów (pchły), wtórnej infekcji bakteryjnej, a nawet całkowicie innej choroby. Może także zająć konieczność zmiany częstotliwości aplikacji roztworu odczulającego, a czasem także zmiany jego składu.

...w trakcie zwiększania dawki roztworu bezpośrednio po jego zaaplikowaniu lub w dniu następnym nastąpi ponowne zaostrzenie się objawów?

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. W takich przypadkach wystarcza z reguły zredukowanie kolejnej dawki o dwa stopnie. Następnie można próbować ponownie zwiększyć dawkę. Jeżeli bezpośrednio po jej zaaplikowaniu znowu wystąpią objawy alergiczne, dawkę należy ponownie zmniejszyć o jeden stopień. Ustaloną w ten sposób dawkę należy traktować jako indywidualną dawkę podtrzymującą.